
 <b>TOKUSHUKAI</b>		腎細胞癌 進行再発		共通コード 764005			
		<b>Nivolumab</b>					
区分： 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia		適応： 18歳以上 PS 0-1		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：		最少 低	
使用薬剤							
番号		略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ニボルマブ		240mg/body	点滴静注	30分	day 1	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		14日 (2週)		総コース数		PDに至るまで	

 <b>TOKUSHUKAI</b>		腎細胞癌 化学療法		共通コード 764006			
		<b>Nivolumab+Ipilimumab</b>					
区分： 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応： 年齢 18歳以上 KPS ≥70%		催吐リスク： 最小 発熱性好中球減少リスク		低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ニボルマブ(オプジーボ®)		240mg/body	点滴静注	30分	day1	あり
2	イピリムマブ(ヤーポイ®)		1mg/kg	点滴静注	30分	day1(1-4コース)	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		4コースまで21日(3週) 5コース以降14日(2週)		総コース数		併用4コース → nivolumab単剤 PDに至るまで	