



TOKUSHUKAI

大腸癌 術後補助化学療法

mFOLFOX6

共通コード

718052

区分: 化学療法 術後補助 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低
------------------------------	----------------------	----------------------------

使用薬剤

番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり

1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	14日(2週)	総コース数	12コース
--------------------------	---------	-------	-------



TOKUSHUKAI

大腸癌 術後補助化学療法

XELOX

共通コード

718122

区分: 化学療法 術後補助 カテゴリー Ib	適応: 20-70歳 PS 0-1	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低
------------------------------	----------------------	----------------------------

使用薬剤

番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり

1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	21日(3週)	総コース数	8コース
--------------------------	---------	-------	------



TOKUSHUKAI

大腸癌 化学療法

mFOLFOX6

共通コード


718053


区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低
------------------------------	----------------------	----------------------------


使用薬剤


番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり


1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	14日(2週)	総コース数	PDに至るまで
--------------------------	---------	-------	---------


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 mFOLFOX6+Bevacizumab				共通コード 718083	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	ベバシズマブ	BEV	5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 FOLFIRI				共通コード 718063	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 FOLFIRI+Bevacizumab				共通コード 718093	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	ベバシズマブ	BEV	5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 XELOX				共通コード 718123	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 XELOX+Bevacizumab				共通コード 718133	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
3	ベバシズマブ	Bmab	7.5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 sLV5FU2				共通コード 718043	
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
3	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI	大腸癌 化学療法 sLV5FU2+Bevacizumab				共通コード 718073		
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
3	ℓ-ロイコボリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
4	ベバシズマブ	BEV	5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI	大腸癌 化学療法 Capecitabine+Bmab				共通コード 718034		
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 最小 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
2	ベバシズマブ	BEV	7.5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI	大腸癌 化学療法 SOX+BEV				共通コード 718002		
	区分: 化学療法(分子標的薬) 進行再発	適応: 年齢 20-80歳 PS 0-1		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ベバシズマブ	BEV	7.5mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
2	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	あり
3	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1夕-15朝	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	

		結腸・直腸癌 化学療法 進行再発 UFT/LV+BEV			共通コード 718007		
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応: 年齢 20歳以上 PS 0-2		催吐リスク: 最小 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	テガフル・ウラシル	UFT	300mg/m ²	内服	8時間毎(1日3回)	day1-21	あり
2	ホリナートカルシウム	LV	75mg/body	内服	8時間毎(1日3回)	day1-21	あり
3	ペバシズマブ	BEV	5mg/kg	点滴静注	30-90分	day1,15	あり
4							
5							
6							
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日(4週)		総コース数		PDに至るまで	

		大腸癌 進行再発 S1+Bevacizumab			共通コード 718006		
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応: 20-80歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少症リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1(夕)-29(朝)	あり
2	ペバシズマブ	Bmab	5mg/kg	点滴静注	30-90分	day1,15,29	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		42日(6週)		総コース数		PDに至るまで	

		大腸癌 化学療法 IRIS			共通コード 718143		
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	125mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
2	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日(4週)		総コース数		PDに至るまで	



大腸癌 進行再発

共通コード

IRIS+Bevacizumab

718174

区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb	適応：20-75歳 PS 0-2	催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：	中 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT11	125mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
2	S-1	S1	80mg/m ²	内服	1日2回	day 1(夕)-15(朝)	あり
3	ベバシズマブ	Bmab	5mg/kg	点滴静注	90分	day 1,15	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		28日(4週)	総コース数	PDに至るまで			



大腸癌 化学療法

共通コード

mFOLFOX6+Panitumumab

718204

区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb	適応：20-75歳 PS 0-2	催吐リスク：中 発熱性好中球減少リスク：低					
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		14日(2週)	総コース数	PDに至るまで			




大腸癌 化学療法


共通コード


mFOLFOX6+Cetuximab


718154


区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb	適応：20-75歳 PS 0-2	催吐リスク：中 発熱性好中球減少リスク：低					
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	セツキシマブ(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	あり
	セツキシマブ(2回目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	60分	day (1),8	
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		14日(2週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI	大腸癌 化学療法 FOLFIRI+Panitumumab		共通コード 718214				
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI	大腸癌 化学療法 FOLFIRI+Cetuximab		共通コード 718164				
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
4	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
5	セツキシマブ(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	あり
	セツキシマブ(2回目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	60分	day(1),8	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI	大腸癌 進行再発 FOLFIRI+Ramucirumab		共通コード 718005				
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー	適応: 年齢 20歳以上 PS 0-1	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ラムシルマブ		8mg/kg	点滴静注	60分	day 1	あり
2	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	点滴静注	3分	day 1	あり
4	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	day1-2	あり
5	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
6							
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)	総コース数	PDに至るまで			

 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 sLV5FU2+Panitumumab				共通コード 718224	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
3	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
4	パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 sLV5FU2+Cetuximab				共通コード 718044	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	3分	day 1	あり
2	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1-2	あり
3	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
4	セツキシマブ(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	あり
	セツキシマブ(2回目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	60分	day (1),8	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法 CPT11+Cetuximab				共通コード 718103	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
2	セツキシマブ(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	あり
	セツキシマブ(2回目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	60分	day (1),8	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法				共通コード 718113	
		Cetuximab					
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	セツキシマブ(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	あり
	セツキシマブ(2回目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	60分	day (1),8,15,22...	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		7日(1週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI		大腸癌 化学療法				共通コード 718234	
		Panitumumab					
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	