



 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 CapeOX				共通コード 716006	
		区分: 化学療法 術後補助化学療法		適応: 18歳以上 PS0~1(KPS 70%以上の患者)		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	カペシタピン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day1夕-15朝	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		8コース(24週)	


 TOKUSHUKAI		胃癌 補助療法 S-1+DOC				共通コード 716019	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 年齢 20-80歳 PS 0-1		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1-14(1コース目)	あり
2						day1-28(8コース目以降)	あり
3	ドセタキセル	DOC	40mg/m ²	点滴静注	1時間	day1(2-7コース目)	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		1-7コース:21日(3週) コース以降:42日(6週)		8		総コース数 手術1年後まで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 SOX				共通コード 716003	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 年齢 20-80歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	あり
2	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1夕-15朝	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 CapeOX				共通コード 716002	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day1夕-15朝	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 S1+CDDP (SP)				共通コード 716023	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day 1-21	あり
2	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	点滴静注	90分	day8	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		35日(5週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 S1+DOC				共通コード 716033	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
2	ドセタキセル	DTX	40mg/m ²	点滴静注	60分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 biweekly CDDP+CPT11				共通コード 716063	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シスプラチン	CDDP	30mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
2	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日(4週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法 Capecitabine+CDDP (XP)				共通コード 716133	
		区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり
2	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	点滴静注	90分	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発 mFOLFOX6				共通コード 716018	
		区分: 化学療法 緩和的 カテゴリー Ib		適応: 年齢 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク 中	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	あり
2	オキサリプラチン	LOHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	急速静注	5分	day1	あり
4	フルオロウラシル	5FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日(2週)		総コース数		PDに至るまで	


		胃癌 進行再発 FOLFOX+Nivolumab			共通コード 716022		
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応：18歳以上 PS:0-1		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：		中 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ニボルマブ	Nivo	240mg/body	点滴静注	30分	day 1	あり
2	オキサリプラチン	OXA	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
3	ℓ-ロイコポリン	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
4	フルオロウラシル	5FU	400mg/m ²	点滴静注	10分	day1	あり
5	フルオロウラシル	5FU	1200mg/m ²	持続静注	46時間	day 1-2	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日 (2週)		総コース数		PDに至るまで (Nivoは最長24週)	


		胃癌 化学療法 S1+CPT11			共通コード 716053		
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 中 発熱性好中球減少リスク： 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day 1-21	あり
2	イリノテカン	CPT-11	80mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日 (4週)		総コース数		PDに至るまで	


		胃癌 化学療法 wPAC			共通コード 716073		
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー la		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 低 発熱性好中球減少リスク： 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パクリタキセル	PAC	80mg/m ²	点滴静注	60分	day 1,8,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日 (4週)		総コース数		PDに至るまで	


 TOKUSHUKAI	胃癌 化学療法 DOC				共通コード 716083		
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 中				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ドセタキセル	DOC	60mg/m ²	点滴静注	60分	day 1	あり


 TOKUSHUKAI	胃癌 化学療法 CPT11				共通コード 716093		
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day 1,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>	28日(4週)	総コース数	PDに至るまで				


 TOKUSHUKAI	胃癌 化学療法 nab-PAC				共通コード 716001		
	区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 中				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nabPAC	260mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>	21日(3週)	総コース数	PDに至るまで				


 TOKUSHUKAI	胃癌 進行再発 weekly nab-Paclitaxel		共通コード 716011				
	区分：化学療法 進行再発 カテゴリー Ia	適応：20歳以上 PS 0-2	催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：	低 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nab-PAC	100mg/m ²	点滴静注	30分	day 1,8,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日 (4週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI	胃癌 進行再発 Ramucirumab		共通コード 716004				
	区分：化学療法(分子標的薬) 進行再発 カテゴリー Ia	適応：年齢 20-上限なし PS 0-1	催吐リスク： 発熱性好中球減少リスク：	最小 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ラムシルマブ		8mg/kg	点滴静注	60分	day1	あり
2							
3							
4							
5							
6							
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		14日 (2週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI	胃癌 進行再発 Ramucirumab + PAC		共通コード 716005				
	区分：化学療法(分子標的薬) 進行再発 カテゴリー Ib	適応：年齢 20-上限なし PS 0-1	催吐リスク： 発熱性好中球減少リスク：	低 低			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ラムシルマブ		8mg/kg	点滴静注	60分	day1,15	あり
2	パクリタキセル	PAC	80mg/m ²	点滴静注	60分	day 1,8,15	あり
3							
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日 (4週)	総コース数	PDに至るまで			


 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発		共通コード 716010					
		<h2>Nivolumab</h2>							
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー Ia		適応：20歳以上 PS 0-1		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：		最少 低			
使用薬剤									
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応		
1	ニボルマブ		240mg/body	点滴静注	30分	day 1	あり		
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>							14日 (2週)	総コース数	PDに至るまで

 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発		共通コード 716008					
		<h2>CapeOX+Trastuzumab</h2>							
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：		中 低			
使用薬剤									
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応		
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり		
2	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day1(夕)-15(朝)	あり		
3	トラスツズマブ (初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり		
	トラスツズマブ (2回目以降)	HER	6mg/kg		30分				
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>							21日 (3週)	総コース数	PDに至るまで

 TOKUSHUKAI		胃癌 化学療法		共通コード 716144					
		<h2>Capecitabine+CDDP+Trastuzumab</h2>							
区分：化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク：		高 低			
使用薬剤									
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応		
1	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day 1-14	あり		
2	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり		
3	トラスツズマブ (初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	あり		
	トラスツズマブ (2回目以降)	HER	6mg/kg		90分	day 1			
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>							21日 (3週)	総コース数	PDに至るまで

 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発 SOX+Trastuzumab			共通コード 716016		
		区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク： 中 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
2	S-1	S1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1(夕)-15(朝)	あり
3	トラスツズマブ (初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
	トラスツズマブ (2回目以降)		6mg/kg		30分		
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日 (3週)		総コース数		PDに至るまで	

 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発 S1+CDDP(SP)+Trastuzumab			共通コード 716007		
		区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応：20-75歳 PS 0-2		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク： 高 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	S-1	S1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1-14	あり
2	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	点滴静注	90分	day 1	あり
3	トラスツズマブ (初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
	トラスツズマブ (2回目以降)		6mg/kg		30分		
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日 (3週)		総コース数		PDに至るまで (最大6コース)	

 TOKUSHUKAI		胃癌 進行再発 CapeOX+Nivolumab			共通コード 716015		
		区分：化学療法 進行再発 カテゴリー lb		適応：18歳以上 PS 0-1 PD-1発現がCPS ≧ 5		催吐リスク： 発熱性好中球減少症リスク： 中 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ニボルマブ	Nivo	360mg/body	内服	30分	day1	あり
2	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	あり
3	カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	内服	1日2回	day1(夕)-15(朝)	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日 (3週)		総コース数		PDに至るまで(Nivoは最長24週)	