

		Tokushukai Oncology Center	膵臓癌 術後補助化学療法 GEM	C25-01A 725012			
適応: 術後補助 年齢 20-75歳 PS 0-2		レジメンカテゴリー: Ia	嘔吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ジェムシタピン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日	総コース数	6コース(術後6週以内に開始)			

		Tokushukai Oncology Center	膵臓癌 化学療法 GEM	C25-01P 725013			
適応: 進行再発 年齢 20-75歳 PS 0-2		レジメンカテゴリー: Ia	嘔吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ジェムシタピン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日	総コース数	PDに至るまで			

		膵臓癌 化学療法 nabPAC+GEM		共通コード 725006			
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ib		適応: 20歳- PS 0-1	嘔吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nabPAC	125mg/m ²	点滴静注	30分	day 1,8,15	あり
2	ジェムシタピン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day 1,8,15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日(4週)	総コース数	PDに至るまで			