

 TOKUSHUKAI		Tokushukai Oncology Center	膀胱癌 化学療法 CDDP+GEM	C67-02P 767023			
適応: 進行再発 年齢 20-75歳 PS 0-2		レジメンカテゴリー: Ib	嘔吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シスプラチン	CDDP	70mg/m ²	点滴静注	90分	day2	あり
2	ゲムシタピン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		28日	総コース数	6コース			

 TOKUSHUKAI		尿路上皮癌 進行再発	Pembrolizumab	共通コード 767001			
区分: 化学療法 進行再発 カテゴリー Ia		適応: 18歳以上 PS 0-2	催吐リスク: 最少 発熱性好中球減少症リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ペンブロリズマブ		200mg	点滴静注	30分	day 1	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		21日(3週)	総コース数	35コースもしくはPDに至るまで			

 TOKUSHUKAI		尿路上皮癌	enfortumab vedotin	共通コード 767004			
区分: 化学療法(分子標的薬) 進行再発 カテゴリー		適応: 年齢 20-上限なし PS 0-1	催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低				
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	エンホルツマブ ベドチン	EV	1.25mg/kg	点滴静注	30分	day1・8・15	あり
2							
3							
4							
5							
6							
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		28日(4週)	総コース数	PDに至るまで			



TOKUSHUKAI

尿路上皮癌 進行再発・根治困難

共通コード

767003

Avelumab

区分：	免疫療法 維持療法 カテゴリー Ia	適応：年齢 18歳- PS 0-1	催吐リスク： 最小 発熱性好中球減少リスク： 低
-----	--------------------------	----------------------	-----------------------------

使用薬剤

番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	アベルマブ		10mg/kg	点滴静注	60分	day1	あり
2							
3							
4							
5							
6							

1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	14 (2週)	総コース数	PDに至るまで
--------------------------	---------	-------	---------